

VACINA INJETÁVEL CONTRA PÓLIO (VIP)

1) COMPOSIÇÃO

A vacina é trivalente e contém os vírus da poliomielite dos tipos 1, 2 e 3, obtidos em cultura celular (VERO) e inativados por formaldeído. Pode conter traços de estreptomicina, neomicina, polimixina e 2-fenoxietanol como conservante.

2) APRESENTAÇÃO

É apresentada na forma líquida, em frasco multidose com 10 doses.

3) CONSERVAÇÃO E VALIDADE

Deve ser conservada entre +2º a +8º C, preferência a + 5ºC. Não pode congelar (chegar a 0ºC). A vacina poderá ser utilizada até 28 dias após a abertura do frasco (verificar a orientação do laboratório produtor)

4) INDICAÇÃO

- A vacina é indicada para prevenir a poliomielite, sendo recomendada na rotina para o esquema básico aos 2, 4 e 6 meses de idade (1ª, 2ª e 3ª doses) – a continuidade do esquema de vacinação contra poliomielite (reforços) deve ser realizada com a vacina VOPb.
- A vacina VIP é indicada para o esquema de vacina contra a poliomielite para crianças e adolescentes até 19 anos de idade.

INDICAÇÕES PARA COMPLETAR O ESQUEMA CONTRA A POLIOMIELITE COM VIP:

- Crianças comunicantes domiciliares/hospitalares de pessoas imunodeprimidas.
- Pessoas submetidas a transplante de medula óssea e órgãos sólidos.
- Crianças que permaneçam internadas por ocasião da idade da vacinação.
- Crianças com história de paralisia flácida associada após dose anterior da vacina pólio oral (VOP).

- Crianças e adultos com HIV/AIDS.
- Criança nascida de mãe HIV positiva (até a liberação médica para receber VOP).

5) ESQUEMA, DOSE, VOLUME E VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Intramuscular (IM) profunda no vasto lateral da coxa em crianças menores de 2 anos; em crianças acima de 2 anos pode ser utilizada a região do músculo deltoide. O volume correspondente a uma dose é 0,5ml.

Esquema sequencial: A vacina VIP será aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade, no primeiro reforço (aos 15 meses) e no segundo reforço (entre 4 e 6 anos de idade) será utilizada a vacina VOPb.

Situações especiais:

- Esquema básico contra a poliomielite: três doses com intervalo de 60 dias (intervalo mínimo: 30 dias) a partir dos 2 meses de idade. Nos primeiros 6 meses de idade, o intervalo mínimo de 30 dias só é recomendado se o indivíduo estiver sob risco iminente de exposição à circulação viral.

- Reforços: o intervalo mínimo da 3ª dose de VIP para o 1º reforço de VOPb é de 6 meses.

A vacina VIP poderá ser aplicada simultaneamente, com qualquer vacina do Programa Nacional de Imunizações. Não há necessidade de intervalos mínimos entre outras vacinas.

Observações:

- Filhos de mães HIV positivas - o médico que acompanha a criança deverá comunicar a liberação da vacina ORAL contra poliomielite para os reforços, POR MEIO DE RELATÓRIO por escrito.

- As crianças consideradas soropositivas ou que não receberam liberação do médico que as acompanha devem permanecer recebendo a vacina Pólio Injetável (VIP).

6) CONTRAINDICAÇÕES

Reação anafilática em dose anterior da vacina ou à algum de seus componentes.

7) EVENTOS ADVERSOS

Locais: eritema discreto no local da aplicação, enduração e dor, geralmente de intensidade leve.

Sistêmicos: febre moderada

Alérgicos: anafilaxia é rara